

LSD-Behandlung bei Patient*innen mit Alkohol- abhängigkeit

LYTA STUDIE



Wer?

- Mindestens 25-jährig
- Alkoholabhängigkeit
- Abgeschlossener Entzug



LSD Dosierung

Entweder zweimalig eine niedrige Dosis LSD oder zweimalig eine mittlere- bis hohe Dosis LSD (bei niedriger Dosis Möglichkeit auf 3. Sitzung mit mittlerer Dosis)



Programm

Standardisiertes ambulantes Therapieprogramm (Gespräche, Fragebögen, Blutentnahmen)



Aufwand

- 8 Therapiesitzungen im Einzel- oder Gruppensetting (zwischen 60 & 120 Minuten)
- 2 Substanztage (niedrige bzw. höhere Dosis LSD): 7 bis 12 h
- Freiwillig: 3 MRT-Untersuchungen bei der Substudie zu der neuronalen Langzeitplastizität



Bolligen-
strasse 111
3000 Bern 60

ORT

Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK)
Basel, Universitätsklinik für Psychiatrie &
Psychotherapie (UPD) Bern, Klinik Südhang

Sie erhalten keine Entschädigung, ausser bei der Teilnahme an der Substudie zur neuronalen Langzeitplastizität erhalten Sie pro MRT-Messung 50 CHF. Es entstehen für Sie keine Kosten

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Daten bei Zustandekommen eines Kontakts registriert werden. Sollten Sie an einer Studienteilnahme nicht interessiert sein, werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht.



+41 58 630 84 48



lyta.upd@unibe.ch